

# 製剤別 標準製剤との比較データ

2024年4月

|           | 後発品   | 標準製剤                                      |
|-----------|---|---|
| 販売元会社名    | 岩城製薬株式会社  |   |
| 商品名       | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」  |   |
| 薬価        | 9.90円/g   | 20.30円/g                                  |
| 成分名・規格    | 1g中 日局 テルビナフィン塩酸塩 10mg(1%)  |   |
| 薬効分類名     | 外用抗真菌剤  |   |
| 効能・効果     | 下記の皮膚真菌症の治療<br>1. 白癬: 足白癬、体部白癬、股部白癬<br>2. 皮膚カンジダ症: 指間びらん症、間擦疹(乳児寄生菌性紅斑を含む)<br>3. 癬風   |   |
| 用法・用量     | 1日1回患部に塗布する。  |   |
| 添加物       | エタノール、イソプロパノール、<br>pH調節剤2成分(乳酸、水酸化Na)   | ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル、<br>プロピレングリコール、エタノール |
| 製品の性状     | 無色～微黄色澄明の液で、特異なおいがある。   | 無色～微黄色澄明の液で、特異なおいがある。                     |
| pH(実測値)   | 4.54  |   |
| 粘度(実測値)   | 3.2 mm <sup>2</sup> /s (20℃)  |   |
| 製剤特性      | (1) 白癬、皮膚カンジダ、癬風などの皮膚の真菌症に用いる。<br>(2) アルコールを基剤とする液剤なので毛髪部にも向くが、刺激作用に注意 ※(3)参照<br>(3) 乳児寄生菌性紅斑に使用する場合、アルコール性基剤が局所刺激作用を有するため、注意して使用すること。<br>(4) 眼科用として角膜、結膜に使用しないこと。著しいびらん面には使用しないこと。<br>※ 診療報酬上の後発医薬品に該当し、一般名処方加算、後発医薬品の各種体制加算に該当します。  |   |
| 標準製剤との同等性 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>モルモット実験的白癬菌感染モデルに対する治療効果</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>モルモット実験的カンジダ菌感染モデルに対する治療効果</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>モルモット実験的癬風菌感染モデルに対する治療効果</p> <p>抗真菌試験の結果、標準製剤と同等であると考えられる。</p> </div> |   |
| 使用期限      | 3年(室温保存 火気を避ける)   |   |
| 包装        | 10g×10、10g×50   | 10g×10                                    |