

バラシクロビル錠500mg「イワキ」 服用される患者さまへ

お薬を飲む前に必ずお読みください。

この薬の作用と効果について

単純ヘルペスウイルスおよび水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑える薬です。
通常、単純疱疹、帯状疱疹、水痘の治療や、性器ヘルペスの再発抑制に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師または薬剤師にご相談してください。

- ◆ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方。
- ◆ **腎臓**が悪い、あるいは**透析**を受けている方。
- ◆ 最近、尿の量が少なくなったり、むくんだりすることがある方。
- ◆ 妊娠または授乳中。
- ◆ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと

服用後、次のような症状や異常に気づいたら、服用をやめて医師または薬剤師に相談してください。

- めまい
- 頭痛
- 手足のしびれ
- 一時的にぼーっとして意識が薄れる
- ふらつき
- ふるえ
- 筋肉のぴくつき

生活上の注意

服薬中は普段より多めに水分をとってください。ただし、水分制限を指導されている方は医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

(医療機関名・連絡先等)