

<その他、ご注意頂きたい点>

フィナステリド錠は健康保険の対象ではありません。従って、このお薬を使うにあたっての医療費全額(薬剤費、診察、調剤、服薬指導など)は患者様がご負担いただくことになります。インターネットなどで個人輸入をした場合、製薬会社で製造されていないニセモノも流通していることもあります。ニセモノを服用した場合には思いがけない健康被害が発生する可能性があるので、医療機関を受診し、医師の処方によって適正な服用をおすすめします。

個人輸入に関する注意については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

フィナステリド錠1mg「TCK」を 服用される患者様へ

服用ガイド

連絡先(医療機関・薬局)



販売元
岩城製薬株式会社



製造販売元
辰巳化学株式会社

この薬を服用する際には、注意しなければならない点がありますので、お薬を飲む前にこのパンフレットを必ずお読みください。

フィナステリド錠[TCK]服用にあたって

このお薬は、うす毛の進行を遅らせるはたらきのものです。効果の目安としては、うす毛が改善される、また抜け毛が減少している場合とがあります。

フィナステリド錠[TCK]服用にあたっての注意点

○ 1日1回決められた量を服用してください。

- ・効果が確認できるまで、通常6ヵ月の服用が必要です。毎日決まった時間に服用するようにしてください。
- ・6ヵ月たっても改善しない場合は、主治医にご相談ください。
- ・飲み忘れた場合は、気が付いたときにその日の分を飲んでください。2回分を一度に飲むことはしないでください。
- ・自分の判断で飲むのを止めたり量を減らしたりしないでください。
- ・誤って多く飲んだ場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

○ 成人男性のみ服用してください。

- ・女性には効果が認められておりません。
- ・20歳未満の方への効果・安全性は確立されていません。
- ・妊婦、妊娠している可能性のある女性または授乳している女性は服用しないでください。

○ 錠剤を分割・粉碎して服用しないでください。

- ・分割・粉碎した場合、妊婦、妊娠している可能性のある女性または授乳している女性は本剤に触れないようにしてください。

- ・本剤はコーティングされているので、割れたり碎けたりしない限り、有効成分に接触することはありません。

○ 以下に当てはまる方は、服用前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- ・以前にお薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- ・前立腺がん検診(PSA検査)を受ける予定がある方
- ・他のお薬を服用している方

○ 以下のようないくつかの症状があらわれた場合には、お薬の服用をやめて、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- ・食欲不振
- ・全身けん怠感
- ・皮膚や粘膜が黄色くなる

○ 他の人には絶対に渡さないでください。

○ 小児の手の届かない所に保管してください。

○ このお薬を服用中、または服用後1ヵ月間は献血をしないようにしてください(日本赤十字社より献血制限の対象となっています)。

この説明書に書いてあることは、特に注意して頂きたいたいことです。このお薬について何か分からぬことがありますなら、医師または薬剤師に相談してください。