

レボフロキサシン錠250mg・500mg「イワキ」 ご使用される患者さんへ

このお薬には、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。

本紙をよくお読みいただき、正しく服用しましょう。

服用にあたってのお願い

主治医または薬剤師の指示を守って服用して下さい。

レボフロキサシンは「**1日1回**」服用することで、

感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

必ず
1日1回で
服用して
ください



服用にあたっての注意事項

- 抗菌薬は主治医または薬剤師の指示どおりに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ速く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。

絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。

- 誤って多く服用した場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- 主治医または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

お薬についてわからないことが、服用中に気になる症状が見られましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

主治医または薬剤師の連絡先