

タクロリムス軟膏 0.1%「イワキ」を ご使用される患者さまへ



このお薬はステロイド外用剤とは違うタイプのアトピー性皮膚炎のお薬です。
ご使用の際は、次のことにご注意ください。

1 次の場所には塗らないでください。

- 皮膚がジュクジュクしているところ
- おできやニキビのあるところ
- 皮膚以外のところ（口や鼻の中の粘膜など）や外陰部



2 塗ったあと、一時的に塗ったところが ほてったり、かゆくなったり、ひりひりしたりする刺激感が 起こったり、入浴時に刺激感が強くなる場合がありますが、 通常は皮膚の症状の改善とともに1週間ほどでおさまります。

刺激感が強かったり、おさまらないような時は、医師・薬剤師に
ご相談ください。

3 1日1～2回、医師が指示した量を塗ってください。 1回に塗る量は5g（チューブ1本）までです。

本剤を塗る前にはよく手を洗って、清潔にしてからお使いください。
塗り終わったあとは、塗った指をきれいに拭いてください。



・軟膏をチューブから約6cm出すと、約0.5gになります。

4

本剤の使用中は**授乳は避けてください。**



5

眼のまわりに塗る場合は、**眼に入らないように気をつけてください。**

まちがって眼に入った時は、水で洗い流してください。(刺激感があれば、眼科医の診察を受けてください。)

6

このお薬を塗ったところへの**日焼けランプや紫外線ランプ**のご使用は避けてください。

また、塗ったところへあたる**日光**の量もできるだけ少なくし、帽子や衣服などで強い日差しを避けてください。



7

このお薬を**2週間塗り続けても症状が良くならない**場合などは、**医師・薬剤師**にご相談ください。



医療機関名