

# くすりのしおり

外用剤

2013年11月作成

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**商品名：**亜鉛華軟膏「コザカイ・M」  
**主成分：**酸化亜鉛 (Zinc oxide)  
**剤形：**白色の軟膏剤  
**シート記載：**

剤形写真準備中

## この薬の作用と効果について

皮膚の収れん、消炎、保護、緩和な防腐作用を示します。  
通常、外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、面皰(にきび)、せつ・よう(できもの)などの収れん・消炎・保護・防腐、その他の皮膚疾患におけるびらん、潰瘍、湿潤面の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください)。

## 用法・用量(この薬の使い方)

- **あなたの用法・用量は**(医療担当者記入)
- 通常、1日1～数回、症状に応じて患部に塗布または貼付します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- 重度または広範囲の熱傷には使用しないでください。
- 眼に使用しないでください。もし誤って目に入ったら水で洗い流してください。
- 塗り忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を塗ってください。ただし、次に塗る時間が近いときは忘れた分を抜き、次回より指示通り使用してください。2回分を一度に使ってはいけません。
- 誤って多く使用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

## 生活上の注意

- 

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと(副作用)

主な副作用として、過敏症状、発疹、刺激感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。  
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。  
該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。