


くすりのしおり

内服剤

2013年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名: タンニン酸アルブミン「NikP」 主成分: タンニン酸アルブミン(Alubmin tannate) 剤形: 淡褐色の散剤 シート記載:	
この薬の作用と効果について 腸で分解してタンニン酸を遊離し、その収れん作用により止しゃ作用と整腸作用を示して下痢を止めます。通常、下痢症の治療に用いられます。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 <ul style="list-style-type: none">・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。牛乳アレルギー、出血性大腸炎、細菌性下痢症、肝障害がある。・妊娠または授乳中・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） ・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>> ・通常、成人は主成分として1日3～4gを3～4回に分けて服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・飲み忘れた場合、気がついたときにできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次の薬の服用時間まで近い場合は、忘れた分を服用しないで、1回分をとばしてください。絶対に2回分を一度に服用してはいけません。 ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
生活上の注意	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、便秘、食欲不振などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 <ul style="list-style-type: none">・じん麻疹、呼吸困難、血圧低下 [ショック、アナフィラキシー様症状] 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法 その他 <ul style="list-style-type: none">・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。