

アタツパレンゲル0.1%「イワキ」 ご使用の患者様へ

次のような方は、このお薬を使用しないでください。

- このお薬によりアレルギーをおこしたことがある方
- 妊娠している方、妊娠している可能性のある方
(このお薬での治療中に妊娠を希望する方も、使用をお控えください)

このお薬の使いはじめに、
塗ったお肌に次の症状があらわれることがあります。

お肌にあらわれる症状

- 乾燥 ●皮膚不快感(ヒリヒリ感など)
- 落屑らくせつ(皮膚が細かくはがれる)
- 紅斑こうはん(赤くなる) ●そう痒感ようかく(かゆみ)

- 症状は通常は軽度で、ほとんどが使いはじめから2週間以内にあらわれ、その後やわらいできます。
- ただし、治療中に症状がなかなかよくならない場合は、医師・薬剤師に相談してください。



治療中は、次のことを守ってください。

- 皮膚刺激感が起こることが多いので皮膚に切り傷、すり傷、湿疹があるところ、眼の周囲・唇・小鼻(粘膜に近いところ)は塗布をさけてください。(眼に入った場合はすぐに水で洗い流してください)
- 皮膚に刺激のある石けんや化粧品などの使用はさけてください。
- 顔に他の塗り薬を使用する場合は、医師に相談してください。
- 海や山で大量の日光をあびることや、日焼けランプでの過度の紫外線照射はさけてください。
- 外出時には、日傘、帽子や日焼け止めを使用してください。
- 授乳中の方は、使用しないでください。
やむを得ず使用する場合は、授乳はしないでください。

▶ 裏面もご覧ください

アタパレンゲル0.1%「イワキ」 の使い方

- 1日1回、おやすみになる前に洗顔後、顔だけに使用してください。ニキビの治療以外にはお使いにならないでください。
- このお薬をなめたり、のんだりしないでください。
- 前日に塗り忘れた場合でも、1日1回適量を就寝前に使用してください。
- 1日に2回塗ったり、1回に2回分を塗ったりしないでください。
- 翌朝は通常どおり洗顔してください。



使用に際して疑問や気になる症状がある場合は、医師・薬剤師に相談してください。

主治医または薬剤師の連絡先



岩城製薬株式会社