


製剤別 標準製剤との比較データ

2025年4月

	後発品	標準製剤																				
販売元会社名	岩城製薬株式会社																					
商品名	ベンダザック軟膏3%「イワキ」																					
薬価	17.00円／g	16.70円／g																				
成分名	ベンダザック																					
規格	1g中 ベンダザック 30mg (3%)																					
薬効分類名	非ステロイド性抗炎症外用剤																					
効能・効果	・アトピー性皮膚炎、乳幼児湿疹、急性湿疹、慢性湿疹、接触性皮膚炎、尋常性乾癬、帯状疱疹 ・褥瘡、熱傷潰瘍、放射線潰瘍																					
用法・用量	・炎症性皮膚疾患 本品の適量を1日数回患部に塗布する。症状によりODT療法、ステロイド外用剤の併用を行う。 ・皮膚潰瘍類 本品の適量を1日数回患部に塗布する。なお、必要に応じて1日1～2回の貼布療法を行う。																					
添加物	白色ワセリン(抗酸化剤としてジブチルヒドロキシトルエンを含む)、モノステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン	白色ワセリン、マイクロクリスタリンワックス、軽質流動パラフィン																				
製品の性状	白色～淡黄白色の油性の軟膏剤で、においはないか、又はわずかに特異においがある。	白色～淡黄白色の軟膏剤																				
pH	3.0～4.5																					
粘度(Pa·s)	25 (実測値)																					
製剤特性	(1)局所抗炎症効果を有し、ステロイドを用いるまでもない軽度の湿疹・皮膚炎等に使用する。 (2)白色ワセリン主体の主薬分散型の軟膏である。 ※ 診療報酬上の後発医薬品に該当し、一般名処方加算1.2、後発医薬品の各種体制加算に該当しません。																					
標準製剤との同等性	・ラットによるカラゲニン足蹠浮腫の抑制効果  <table border="1"> <caption>ベンダザック軟膏3%「イワキ」 カラゲニン浮腫抑制効果 n=12</caption> <thead> <tr> <th>判定時間 (hr)</th> <th>ベンダザック軟膏3%「イワキ」</th> <th>標準製剤</th> <th>ベンダザック軟膏3%「イワキ」基剤</th> <th>無塗布</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>~10</td> <td>~10</td> <td>~-10</td> <td>~-10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>~30</td> <td>~35</td> <td>~-10</td> <td>~-10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>~40</td> <td>~40</td> <td>~10</td> <td>~10</td> </tr> </tbody> </table> ラット足蹠に起炎物質を皮下注射2時間前および1時間前に薬剤を塗布した。その後起炎物質を皮下注射し、1、3、5時間後の浮腫抑制率を比較したところ、両薬剤の浮腫抑制効果に有意な差はみられず、両剤は同等の効力を持つと考えられる。	判定時間 (hr)	ベンダザック軟膏3%「イワキ」	標準製剤	ベンダザック軟膏3%「イワキ」基剤	無塗布	1	~10	~10	~-10	~-10	3	~30	~35	~-10	~-10	5	~40	~40	~10	~10	
判定時間 (hr)	ベンダザック軟膏3%「イワキ」	標準製剤	ベンダザック軟膏3%「イワキ」基剤	無塗布																		
1	~10	~10	~-10	~-10																		
3	~30	~35	~-10	~-10																		
5	~40	~40	~10	~10																		
使用期限	3年(室温保存)	4年(室温保存)																				
包装形態	10g×10、 10g×50、 500g	10g×10、 10g×50、 500g																				