

くすりのしおり

外用剤

2020 年 06 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名: クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」 主成分: クロベタゾン酪酸エステル(Clobetasone butyrate) 剤形: 白色～微黄色の半透明の油性の軟膏剤、（チューブ）淡青色に淡緑色の帯、（キャップ）淡黄色 シート記載:	
この薬の作用と効果について 合成副腎皮質ステロイドで、抗炎症作用や抗アレルギー作用により、皮膚の炎症症状を緩和します。通常、アトピー性皮膚炎や湿疹・皮膚炎の治療に用いられます。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。湿疹性外耳道炎、潰瘍、熱傷・凍傷、細菌・真菌・ウイルス皮膚感染症がある。 ・妊娠または授乳中 ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） ・あなたの用法・用量は（:医療担当者記入） ・通常、1 日 1～数回適量を患部に塗布します。症状により適宜増減されます。必ず指示された使用方法に従ってください。 ・眼の中に入らないように注意してください。誤って眼に入ったら水で洗い流してください。それでもおかしい感じがあれば、眼科医の診察を受けてください。 ・長期または大量に使用したり、密封法（ODT）を行うと、副作用が出やすくなります。オムツは密封法と同じ作用があるので、特に注意してください。 ・塗り忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く 1 回分を塗ってください。ただし、次に塗る時間が近いときは忘れた分を抜き、次回より指示通り使用してください。2 回分を一度に使ってはいけません。 ・誤って多く塗った場合は、医師または薬剤師に相談してください。 ・医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。	
生活上の注意 ・この薬の油脂成分は、コンドームなどのラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるの で、これらとの接触を避けてください。	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、紅斑、発疹、じん麻疹、かゆみ、皮膚灼熱感、接触性皮膚炎などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 ・激しい眼痛、頭痛、急激な視力低下、〔緑内障〕 ・まぶしい、かすんで見える、視力低下〔後のう白内障〕 ・まぶしい、かすんで見える、目が乾く、眼の痛み〔眼圧亢進〕 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法 その他 ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄	年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。