くすりのしおり

620477701
2010 年 4 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ディクアノン配合内用液

主成分：水酸化アルミニウム・ゲル（Aluminum hydroxide gel）
水酸化マグネシウム（Magnesium hydroxide）
剤形：白色の粘稠性のある懸濁液剤
シート記載：

この薬の作用と効果について

制酸作用により胃酸を中和し、胃酸の働きをおさえます。
通常、胃・十二指腸潰瘍、胃炎、上部消化管機能異常による制酸作用と症状の改善に用いられます

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。透析療法中、腎障害、心機能障害、高マグネシウム血症、リン酸塩低下がある、下痢をしている。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- **あなたの用法・用量は≪** ：医療担当者記入≫
- 通常、成人は 1 日に 16～48mL を数回に分けて服用します。治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、次に通常飲む時間が近い場合は、忘れた分を飲まずに、1 回分をとばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- 牛乳や健康食品（カルシウム、クエン酸、ビタミン D_3、鉄など含むもの）の中には、薬の効果に影響を与える場合がありますので、注意してください。医師または薬剤師に相談してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、食欲不振、悪心、胃部不快感、便秘、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、［　］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄　　年　　月　　日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。