

デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」を服用される方へ

服用中は次のことに注意しましょう

- **医師の指示どおりに、服用してください。**
1日1回、1カプセルを毎日忘れずに服用しましょう。
食事の影響を受けないので、いつでも服用できます。
- **カプセルをかんだり、開けたりせずに服用してください。**
カプセルの内容物は、口やのどの粘膜を刺激する場合があります。
- **女性や20歳未満の方は服用しないでください。また、カプセルから漏れた薬剤に触れないでください。**
 - ・妊娠している女性では、男子胎児の生殖器官等の発達に影響をおよぼすおそれがあります。
 - ・カプセルの中の薬剤に触れると、皮膚から有効成分が吸収されてしまいます。もし触れてしまったら、すぐに石けんと水で洗い流してください。
- **PSA検査を受ける方へ**
このお薬は、前立腺疾患の治療における検査で測定される PSA（血清前立腺特異抗原）*の数値を低下させるので、PSA検査を行う際は、デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」を服用中であることを必ず担当の医師にお伝えください。
※PSAとは、前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標です。また、他の前立腺疾患治療にも参考にされます。
- **この薬には併用を注意すべき薬があります。**
他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

ここに書いてあることは、特に注意していただきたいことです。
何かわからないことがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

主治医または薬剤師の連絡先

製造販売元



岩城製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2

デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」の効能・効果

男性における男性型脱毛症

- 上記以外の脱毛症の治療を目的として服用することはできません。
- このお薬による治療では、**脱毛部分に治療前と比べて太く長い毛の本数が増える**といった発毛効果が期待できます。
- 男性型脱毛症は、AGA (Androgenetic alopeciaの略) とも呼ばれます。

デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」の服用を続けるにあたって

このお薬の服用により、3ヵ月で効果があらわれる人もいますが、効果がきちんと出ているか確認するために、通常6ヵ月、お薬を飲み続ける必要があります。

このお薬は、6ヵ月服用した後も毎日きちんと飲み続ける必要があります。症状がよくなったと自己判断して使用をやめてしまったり、量を減したりすると、再び髪の毛が元の状態に戻ってしまいます。

ご自身の判断でこの薬の服用を中止せず、医師の指示どおり服用を継続しましょう。


デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」のはたらき

デュタステリドは、男性ホルモンのテストステロンを、より作用の強いジヒドロテストステロンへと変換する1型と2型5 α -還元酵素の働きを阻害します。

ジヒドロテストステロンは男性頭部の毛根に働き、毛の成長を抑制してヘアサイクルのうちの成長期を短くし、細く短い毛を増やし、脱毛を早めてAGAを起こします。

デュタステリドは、作られるジヒドロテストステロンの量を減らし、健康なヘアサイクルを取り戻すことで、脱毛を防ぎ、毛の成長を促します。

*DHT:ジヒドロテストステロン 男性型脱毛症に関与する男性ホルモンのひとつ。
毛髪の成長期を徐々に短くし、成長を妨げるため、毛髪が細く短くなっていく。



副作用に気をつけましょう

このお薬を服用中に、以下のような症状があらわれることがあります。気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にすぐに相談してください。

特に注意が必要な重大な副作用

●肝機能障害、黄疸

〔からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる など〕

そのほかの主な副作用

●勃起不全、性欲減退、射精障害

(これらの副作用は、お薬の服用を中止したあとも持続する場合があります。)

●乳房障害〔乳房のはれや痛み〕

- 男性の生殖能力への影響は知られていませんが、精子の数や精液量を減らしたり、精子の運動を弱めてしまう可能性があります。
- この薬の有効成分であるデュタステリドとの関連性は明らかではありませんが、前立腺肥大症患者を対象とした海外臨床試験において、乳癌が報告されました。
- 前立腺癌のリスクが高い男性を対象とした臨床試験において、デュタステリドを服用した男性は、デュタステリドを服用しなかった男性と比べて、悪性度の高い前立腺がんの発現頻度が高かったという報告があります。