

くすりのしおり

外用剤
2013年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名：白色ワセリン 主成分： 白色ワセリン(White petrolatum) 剤形： 白色～微黄色の軟膏 シート記載：	剤形写真準備中
この薬の作用と効果について 医薬品として石油から精製した軟膏状の物質です。刺激性がほとんどなく、動物性油脂や植物性油脂よりも安定性に優れています。 通常、軟膏などの皮膚外用剤の材料として、または単独で皮膚保護剤として使います。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 <ul style="list-style-type: none">・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。・妊娠または授乳中・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） ・ あなたの用法・用量は << >> :医療担当者記入<>> ・ 通常、清潔な手指で患部に適量を塗布します。必ず指示された使用方法に従ってください。 ・ 塗り忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を塗ってください。ただし、次に塗る時間が近いときは忘れた分を抜き、次回より指示通り使用してください。2回分を一度に使ってははいけません。 ・ 誤って多く使った場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・ 医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。不安な場合は担当の医師や薬剤師にご相談ください。	
生活上の注意	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 副作用として、特に報告はありません。使っていていつもと違う症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 該当する記載事項はありません。 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法 その他 <ul style="list-style-type: none">・ 乳幼児、小児の手の届かないところで直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。