水虫で
たむし

ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」、
ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」を
使用される方へ

3つの
ポイント

監修 東京医科大学皮膚科 主任教授 原田和俊 先生

ポイント1 薬を正しくぬる

- ① お風呂で足や体をやさしく洗い、よく拭いて乾燥させます
- ② 症状のある範囲よりも広く、やさしくぬります

菌は目に見えないところにも潜んでいます
そのため、**症状のある部分よりも広くぬることが大切です**
※下のイラスト斜線部分全面にぬりましょう

ぬり方

- ▶ 足の裏全体、指の間や外側面にもぬる
- ▶ 症状が片足でも、両足にぬる

外側面

指の間

足裏

- ▶ 症状がある部分よりも一回り大きくぬる

患部

- 人差し指の第一関節より少し多めの量でぬれる目安

薬の量

- ▶ 片足分

- ▶ 両手のひらの面積分

岩城製薬株式会社

ポイント2

薬を継続して使う

- ① お薬は1日1回、毎日ぬりましょう
- ② 治療期間には目安があります

足

▶ 2～3ヵ月
程度※

体部/
股部

▶ 2～4週間
程度

※足の皮膚は1ヵ月で入れ替わります
その後、さらに1～2ヵ月ぬり続けることで再発予防につながります

見た目がよくなっても、自己中断せず、
医師に治ったと言われるまで続けましょう

ポイント3

清潔にする

① 洗う

- ▶ 石けんを使ってやさしく洗います
- ▶ 足は指の間も丁寧に洗いましょう

② 乾燥させる

- ▶ 洗った後は
しっかり
拭きましょう

③ 蒸らさない

- ▶ 通気性のよい
靴や靴下を
履きましょう

家族への感染を防ぐために、足ふきマットやスリッパは個人用にしましょう。また、再発しないように、サウナやプールなどの共用施設を利用した後は、しっかり足を洗うことも大切です。

岩城製薬株式会社