

製剤別 標準製剤との比較データ

2026年4月

	後発品	標準製剤																																											
販売元会社名	岩城製薬株式会社																																												
商品名	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」																																												
薬価	14.90円/g	28.20円/g																																											
成分名、含量	1g中 ルリコナゾール 10mg																																												
薬効分類名	抗真菌剤																																												
効能・効果	下記の皮膚真菌症の治療 白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬 カンジダ症：指間びらん症、間擦疹 癬 風																																												
用法・用量	1日1回患部に塗布する。																																												
添加物	合成スクワラン、サラシミツロウ、ジブチルヒドロキシトルエン、乳酸、白色ワセリン(抗酸化剤としてジブチルヒドロキシトルエンを含む)、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ポリソルベート60、N-メチル-2-ピロリドン	合成スクワラン、サラシミツロウ、ジブチルヒドロキシトルエン、乳酸、白色ワセリン、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ポリソルベート60、N-メチル-2-ピロリドン																																											
製品の性状	白色～微黄色の軟膏 わずかに特異なおい	白色～微黄色の軟膏 わずかに特異なおい																																											
製剤特性	<p>1. ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」は、国内で初めてルリコナゾールを有効成分とするジェネリック医薬品として製造販売承認を取得した製品です。</p> <p>2. ルリコナゾールはイミダゾール系の抗真菌薬であり、皮膚糸状菌、Candida属及びMalassezia属真菌に対して抗真菌活性を有することが認められています。</p> <p>3. ルリコナゾールは、真菌細胞膜の必須構成成分であるエルゴステロールの生合成を阻害して抗真菌作用を示します。</p> <p>※ 診療報酬上の後発医薬品に該当し、一般名処方加算1,2に該当します。</p>																																												
標準製剤との同等性	<p>(1)</p>  <p>(2)</p> <p>40℃75%RHにおける安定性試験</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>製品名</th> <th>包装</th> <th>項目</th> <th>試験開始時</th> <th>2ヵ月</th> <th>4ヵ月</th> <th>6ヵ月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」</td> <td rowspan="5">チューブ</td> <td>外観</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>確認試験</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>純度試験</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>粘度</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>含有率 残存率として(%)</td> <td>100%</td> <td>100.7%</td> <td>100.4%</td> <td>100.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>角層中ルリコナゾール未変化体量 (ng/2.83cm²)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>製剤/適用時間(hr)</th> <th>8</th> <th>24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」</td> <td>966.3130 ±290.2532</td> <td>535.6490 ±247.6008</td> </tr> <tr> <td>標準製剤(軟膏剤、1%)</td> <td>947.7129 ±297.3630</td> <td>489.9345 ±216.6816</td> </tr> </tbody> </table> <p>(平均値±標準偏差、n=16)</p> <p>角層中ルリコナゾール未変化体量は、被験者の選択、角層の剥離回数、適用時間等の試験条件によって異なる可能性がある。</p>		製品名	包装	項目	試験開始時	2ヵ月	4ヵ月	6ヵ月	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	チューブ	外観	適合	適合	適合	適合	確認試験	適合	適合	適合	適合	純度試験	適合	適合	適合	適合	粘度	適合	適合	適合	適合	含有率 残存率として(%)	100%	100.7%	100.4%	100.2%	製剤/適用時間(hr)	8	24	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	966.3130 ±290.2532	535.6490 ±247.6008	標準製剤(軟膏剤、1%)	947.7129 ±297.3630	489.9345 ±216.6816
製品名	包装	項目	試験開始時	2ヵ月	4ヵ月	6ヵ月																																							
ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	チューブ	外観	適合	適合	適合	適合																																							
		確認試験	適合	適合	適合	適合																																							
		純度試験	適合	適合	適合	適合																																							
		粘度	適合	適合	適合	適合																																							
		含有率 残存率として(%)	100%	100.7%	100.4%	100.2%																																							
製剤/適用時間(hr)	8	24																																											
ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	966.3130 ±290.2532	535.6490 ±247.6008																																											
標準製剤(軟膏剤、1%)	947.7129 ±297.3630	489.9345 ±216.6816																																											
使用期限	3年(室温保存)																																												
包装	10g×10	10g×10本、10g×20本																																											