

# くすりのしおり

外用剤

2022年09月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力がが必要です。

## 製品名：ルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」

主成分：ルリコナゾール(Luliconazole)

剤形：白色～微黄色の軟膏剤

シート記載など：



## この薬の作用と効果について

真菌の細胞膜の構成成分であるエルゴステロールの合成阻害作用により抗真菌作用を示します。通常、皮膚真菌症〔白癬（足白癬、体部白癬、股部白癬）、カンジダ症（指間びらん症、間擦疹）、癬風〕の治療に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、1日1回患部に塗布します。必ず指示された使用法用に従ってください。
- ・眼科用として角膜、結膜には使用しないでください。
- ・著しいびらん面には使用しないでください。
- ・塗り忘れた場合は、気が付いた時に1回分を塗ってください。ただし、次に塗る時間が近い場合は忘れた分は抜き、次回より指示通り使用してください。2回分を一度に塗布してはいけません。
- ・誤って多く使用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに使うのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・衣類に付着すると黄色に着色することがあるので注意してください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、かゆみ、発赤、刺激感、接触皮膚炎、疼痛、湿疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。