

くすりのしおり

外用剤

2022年04月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ニゾラールローション 2%

主成分：ケトコナゾール (Ketoconazole)

剤形：白色のローション剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

真菌（カビ）の細胞膜合成を阻害し、病気の原因となる真菌の増殖を抑えることにより抗真菌作用を示します。

通常、皮膚真菌症（白癬、皮膚カンジダ症、癬風、脂漏性皮膚炎）の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・白癬、皮膚カンジダ症、癬風：通常、1日1回患部に塗布します。
脂漏性皮膚炎：通常、1日2回患部に塗布します。
いずれの場合も、必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・使用時にはよく振ってから使用してください。
- ・著しいびらん面には使用しないでください。
- ・目には使用しないでください。目に入った場合はすぐに水またはぬるま湯で洗い、医師または薬剤師に相談してください。
- ・使い忘れた場合は、気がついた時に1回分を塗ってください。2回分を一度に使用してはいけません。
- ・誤って多く使用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、刺激感、かゆみ、接触皮膚炎、紅斑、水疱などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。