

## くすりのしおり

外用剤

2013年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
<b>商品名:</b> 消毒用エタノール「コザカイ・M」 <b>主成分:</b> エタノール(Ethanol) <b>剤形:</b> 無色澄明な液剤 <b>シート記載:</b>	剤形写真準備中
<b>この薬の作用と効果について</b> 栄養型細菌（グラム陽性菌・陰性菌）、酵母菌、ウイルスなどに殺菌消毒作用を示します。 通常、手指・皮膚、手術部位の皮膚、医療機器の消毒に用いられます。	
<b>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。</li><li>・妊娠または授乳中</li><li>・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。</li></ul>	
<b>用法・用量（この薬の使い方）</b> ・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>> ・通常、そのままの液（主成分として76.9～81.4vol%）を消毒部位に塗布します。必ず指示された使用方法に従ってください。 ・傷のある皮膚および粘膜には、刺激作用があるので使用しないでください。 ・血清・膿汁などの有機物が殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合はよく洗い落としてから使用してください。 ・外用剤なので、飲んだり、吸入したりしないでください。 ・眼には入らないように注意してください。もし誤って目に入ったら水で洗い流してください。 ・傷のある皮膚および粘膜には、刺激作用があるので使用しないでください。 ・広範囲または長期間に使用した場合、蒸気を吸わないよう注意してください。 ・同一部位へのくり返しの使用で、脱脂による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。 ・使い忘れた場合は、すぐに消毒をしてください。 ・誤って多く使用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。 ・医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。	
<b>生活上の注意</b>	
<b>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）</b> 主な副作用として、発疹、皮膚の刺激症状などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 <b>まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。</b> <b>このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</b> 該当する記載事項はありません。 <b>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</b>	
<b>保管方法 その他</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気、火気を避けて保管してください。</li><li>・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。</li></ul>	
<b>医療担当者記入欄</b>	年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。