

## くすりのしおり

外用剤

2013年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：トリゾンラブ消毒液 0.2%

主成分：ベンザルコニウム塩化物(Benzalkonium chloride)

剤形：無色の澄明な液剤、（キャップ）白色

シート記載：



### この薬の作用と効果について

微生物の細胞膜の破壊や代謝の阻害により殺菌消毒作用を示しますが、ウイルスや結核菌などには効果がありません。

通常、医療施設における医師、看護師などの医療従事者の手指消毒に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>
- ・通常、薄めずそのまま薬（主成分として0.2%）をポンプ1押しし、約3mLを手に取り、乾燥するまで摩擦します。手術時の手指消毒には手指および前腕部を石けんでよく洗ったあと、薬（ポンプ1押し約3mL）を手に取り、乾燥するまで摩擦します。更にこの消毒を2回繰り返します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・石けん分や血清・膿汁などの有機物が殺菌作用を減弱させるので、手にこれらが付着している場合はよく洗い落としてから使用してください。
- ・傷や怪我のある皮膚に使わないよう注意してください。
- ・外用剤なので、飲んだり、吸入したり、注射などに使用しないでください。また粘膜、および体腔内に使用しないでください。誤って飲んでしまった場合、様子がおかしいようであれば医師に相談してください。もし誤って眼に入ったら水で洗い流してください。それでもおかしい感じがあれば、眼科医の診察を受けてください。
- ・使い忘れた場合は、すぐに消毒をしてください。
- ・誤って多く使用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

### 生活上の注意

- ・くり返しの使用で、手に皮膚荒れを起こすことがあるので保湿剤などで油分を補ってください。
- ・この薬で消毒した手指で、皮膚の弱い新生児をさわると新生児の皮膚がかぶれることがあるので注意してください。

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、紅斑、そう痒感、浮腫、皮膚の刺激症状などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、火気、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

### 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。