販売元会社名 岩城製薬株式会社	发月1月1 保守	= 設別との比較) 一タ	2024年4月
商品名		後発品(基礎的医薬品)	標準製剤(基礎的医薬品)
<ul> <li>歌曲名</li> <li>教育(0.05% FMYK)</li> <li>東価</li> <li>18.90円/g</li> <li>成分・規格</li> <li>1g中 ベタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.5mg(0.05%)</li> <li>薬効分類名</li> <li>温疹・皮膚炎群(手湿疹、進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾燥、虫さされ、業疹・毒疹、疾疹科(ストロフルス、じん療疹検育癌、能節性痒疹を含む)、放皮症、放斑症(多形炎・セ虹炎、ウリエ適心性質状質(マラン・サーデス、肉芽腫症(サルコイドーシス、環状肉芽腫)、特条性色素性素質(マコーキー素斑、シャンパーウ病、円形形毛症、肥厚性瘢痕・ケロイド、悪性リンパ腫(菌状息肉症含む)、アミロイド苔癬、水疱症(天疱瘡)、円形形毛症、肥厚性瘢痕・ケロイド、悪性リンパ腫(菌状息肉症含む)、アミロイド苔癬、水疱症(天疱瘡)、フロピレン クがみずた胃炎・水疱性乳天疱瘡)</li> <li>崩冻、月量</li> <li>通常、1日1~数回、適量を患部に塗布する。</li> <li>添加物</li> <li>ボリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、プロピレン フクワラン、ゲル化炭化水素、パラフィン、白イフセリン</li> <li>類カウトな治性の軟膏で、においはないカワセリンール、白色ワセリンを主体とした軟膏である。</li> <li>(1)局所抗炎症効果はVery Strong。(アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021)</li> <li>(2)治性の白色ワセリンを主体とした軟膏である。</li> <li>※基礎的医薬品に該当し、一般名処方加算、後発医薬品の各種体制加算に該当しません。</li> <li>(1)皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。</li> <li>(1)皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。</li> <li>(1)皮膚血管収縮性を入り上の皮膚の59% 「MYK」及び標準製剤(軟膏剤、0.05%)の対エステルプロピオン酸エステルが高0.05% 「MYK」及び標準製剤(軟膏剤、0.05%)のカナル砂酸は、ラットタンの酸型エステルが高の59% 「MYK」と標準製剤(軟膏剤、0.05%)のカナル砂酸は、ラットの対・カナル・シールを設し、ラットの対・カナル・シールを設し、ラットの対・ステル・プロピオン酸エステル・カラグニン足痒睡即制試験、ラット血管、透性甲酸が良・ラットカーシーン足痒睡即動は験、ラット血管、透光性卵酸が良、ラットカラグニン足痒睡卵動は験、ラット血管、透光性卵酸が良、ラットカラグニン足痒睡卵動は験、ラット血管、透光性卵酸が良、ラットカラグニン足痒地切りは後、ラット血管、透光性の関連が良、ラットのカナステルプロピオン酸エステル・教育のな食血管・収縮性を大力、大力の大力・対に対しを発生が、カナル・カナル・カナル・カナル・カナル・カナル・カナル・カナル・カナル・カナル・</li></ul>	販売元会社名	岩城製薬株式会社	
成分・規格	商品名		
要効分類名  副腎皮質ホルモン外用剤  温疹・皮膚炎群(手温疹、進行性指学角皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾癬、虫さされ、薬疹・毒疹、痒疹群(ストロフルス、じん麻疹棒苔癬、結節性痒疹を含む)、乾癬、虫さされ、薬疹・毒疹、痒疹群(メトロブルス、じん麻疹棒苔癬、結節性痒疹を含む)、紅皮症、紅斑症(多形)等が、根ズエリテマトーデス、肉芽腫症(サルコイドーシス、環状肉芽腫)、特発性色素性紫斑(マヨッキー紫斑、シャンパー分角)、円形脱毛症、肥厚性瘢痕・ケロイド、悪性リンパ腫(菌)状息肉症含む)、アミロイ苔癬、水疱症(天疱瘡群、ジューリング疱疹状皮膚炎・水疱性類天疱瘡)  用法・用量  通常、1日1~数回、適量を患部に塗布する。  ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、プロビレン グリコール、白色ワセリン  はとんどにおいのない白色の軟膏剤  にとんどにおいのない白色の軟膏剤  はとんどにおいのない白色の軟膏剤  にとんどにおいのない白色の軟膏剤  はとんどにおいのない白色の軟膏剤  (1)局所抗炎症効果はVery Strong。(アトビー性皮膚炎診療ガイドライン2021) (2)油性の白色ワセリンを主体とした軟膏である。 ※ 基礎的医薬品に該当し、一般名処方加算、後発医薬品の各種体制加算に該当しません。  皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。 (1)皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。 (1)皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。 (1)皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。 (1)た腐血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。 (1)た腐血管収縮能を示し、標準製剤との比較においても有定差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。その結果、火多少の整度エステルが動きのの対し対しまいても有定差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。	薬価	18.90円/g	18.90円/g
温疹・皮膚炎群(手温疹、進行性指学角皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾癬、虫さされ、薬疹・毒疹、痒疹群(ストロフルス、じん麻疹検苔癬 結節性痒疹を含む)、紅皮症、紅斑症(多形渗)性紅斑、ダリニ適心性環状紅斑)、ジベル薔薇色粃糠疹、辛酸膿疱症、扁平紅色苔癬、慢性板状 リテマトーデス 肉芽腫症 (ソルコバーシス、環状肉芽腫・特発性色素性薬斑(マヨッキー紫斑、シャンパーク病)、円形炭毛症、肥厚性瘢痕・ケロイド、悪性リンパ腫 歯状息肉症を含む)、アミロイド苔癬、水疱症(天疱瘡群、ジューリン/疱疹)、水疱性類天疱瘡) 一番、1日1~数回、適量を患部に塗布する。 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、プロピレン フクワラン、ゲル化炭化水素、パラフィン、白ケワリール、白色ワセリン 日色の均一な油性の軟膏で、「たおいはないか又はわずかに特異なにおいがある。 (1)局所抗炎症効果はVery Strong。(アトビー性皮膚炎診療ガイドライン2021) (2)油性の白色ワセリンを主体とした軟膏である。 ※ 基礎的医薬品に該当し、一般名処方加算、後発医薬品の各種体制加算に該当しません。 (1)皮膚血管収縮作用 ペタメタシン酪酸エステルが高の596「MYK」及び標準製剤(軟膏剤、0.05%)を健康成人男子20名の左右上育部に4時間管理薬品し、除去後経時的に皮膚蛋白皮の判定を健康成人男子20名の左右上育部に4時間管理薬品上ステル教育の596「MYK」及び標準製剤(軟膏剤、0.05%)を健康成人男子20名の左右上育部に4時間管理薬品上ステル教育の596「MYK」と時間でが確認された。 (2) 抗炎症作用 ペタメタシン酪酸エステルプロピオン酸エステル教育の596「MYK」と標準製剤(軟膏剤、0.05%)の効力比較試験(ラットの中)を対理が開土で、カードの内の大型に大学、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	成分•規格	1g中 ベタメタゾン酪酸エステルフ	プロピオン酸エステル 0.5mg(0.05%)
新能・効果  ・	薬効分類名	副腎皮質ホルモン外用剤	
添加物   ボリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、プロピレン   スクワラン、ゲル化炭化水素、バラフィン、白イワセリン   フィール、白色ワセリン   スクワラン、ゲル化炭化水素、バラフィン、白イワセリン   2)   日色の均一な油性の軟膏で、においはないか   スにわずかに特異なにおいがある。   (1) 局所抗炎症効果はVery Strong。(アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021)   (2) 油性の白色ワセリンを主体とした軟膏である。   ※ 基礎的医薬品に該当し、一般名処方加算、後発医薬品の各種体制加算に該当しません。   (1) 皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。   (1) 皮膚血管収縮作用   ペタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル教育の596「MYK」及び標準製剤(教育剤、0.05%)   を健康成人男子20名の左右上背部は特間密封塗布し、除去後経時的に皮膚直白度の判定を行い比較検討した。その結果、ペタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル教育の596「MYK」は著明な皮膚血管収縮能を示し、標準製剤との比較においても有意差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。   (2) 抗炎症作用   ペタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル対音が重視を対象に対しても有意差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。   (2) 抗炎症作用を示し、標準製剤との比較においても有意差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。   (4)   (4)   (5)	効能∙効果	湿疹・皮膚炎群(手湿疹、進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾癬、虫さされ、薬疹・中毒疹、痒疹群(ストロフルス、じん麻疹様苔癬、結節性痒疹を含む)、紅皮症、紅斑症(多形滲出性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑)、ジベル薔薇色粃糠疹、掌蹠膿疱症、扁平紅色苔癬、慢性円板状エリテマトーデス、肉芽腫症(サルコイドーシス、環状肉芽腫)、特発性色素性紫斑(マヨッキー紫斑、シャンバーク病)、円形脱毛症、肥厚性瘢痕・ケロイド、悪性リンパ腫(菌状息肉症を含む)、アミロイド苔癬、水疱症(天疱瘡群、ジューリング疱疹状皮膚炎・水疱性類天疱瘡)	
### 製品の性状 ほとんどにおいのない白色の軟膏剤 白色の均一な油性の軟膏で、においはないか 又はわずかに特異なにおいがある。  (1)局所抗炎症効果はVery Strong。(アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021) (2)油性の白色ワセリンを主体とした軟膏である。 ※ 基礎的医薬品に該当し、一般名処方加算、後発医薬品の各種体制加算に該当しません。  (1) 皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。 (1) 皮膚血管収縮作用 ペタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏の15% 「MYK」及び標準製剤(軟膏剤、0.05%)を健康成人男子20名の左右上背部に4時間密封塗布し、除去後経時的に皮膚蒼白度の判定を行い比較検討した。その結果、ペタメタソン酪酸エステル水膏のの5% 「MYK」は著明な皮膚血管収縮能を示し、標準製剤との比較においても有意差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。  (2) 抗炎症作用 ペタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏の0.05% 「MYK」と標準製剤(軟膏剤、0.05%)の効力比較試験(ラットカロトン油耳浮腫抑制試験、ラットカデニン足浮腫抑制試験、ラット血管透過性抑制試験、ラットカ単循矩抑制試験、ラットカラゲニン足浮腫抑制制数。ラットカービー・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カー	用法•用量	通常、1日1〜数回、適量を患部に塗布する。	
製剤特性	添加物		
2(2)油性の白色ワセリンを主体とした軟膏である。   ※ 基礎的医薬品に該当し、一般名処方加算、後発医薬品の各種体制加算に該当しません。   皮膚血管収縮作用及び動物における抗炎症作用により生物学的同等性を確認している。   (1) 皮膚血管収縮作用   ペタメタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「MYK」及び標準製剤(軟膏剤、0.05%)を健康成人男子20名の左右上背部に4時間密封塗布し、除去後経時的に皮膚蒼白度の判定を行い比較検討した。その結果、ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」は著明な皮膚血管収縮能を示し、標準製剤との比較においても有意差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。   (2) 抗炎症作用   ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」と標準製剤(軟膏剤、0.05%)の効力比較試験(ラットクロトン油耳浮腫抑制試験、ラットカラゲニン足浮腫抑制試験、ラット血管透過性抑制試験、ラット肉芽増殖抑制試験、ラットカラゲニン足浮腫抑制試験、ラット血管透過性抑制試験、ラット肉芽増殖抑制試験、ラットカラゲニン足浮腫抑制試験、ラット血管透過性抑制試験、ラット肉芽増殖抑制試験、ラットカラゲニン足浮腫抑制試験、ラット血管透過性抑制試験、ラット肉芽増殖抑制試験で実施した。その結果、ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルプロピオン酸エステルが育0.05%「MYK」は著明な抗炎症作用を示し、標準製剤との比較においても有意差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。   使用期限   3年(室温保存)   5g×10、5g×50、10g×10、10g×50	製品の性状	ほとんどにおいのない白色の軟膏剤	白色の均一な油性の軟膏で、においはないか 又はわずかに特異なにおいがある。
(1) 皮膚血管収縮作用	製剤特性	(2)油性の白色ワセリンを主体とした軟膏である。	
<b>匀</b> 基 5g×10,5g×50,500g 5g×10、5g×50、10g×10、10g×50		(1) 皮膚血管収縮作用 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」及び標準製剤(軟膏剤、0.05%) を健康成人男子20名の左右上背部に4時間密封塗布し、除去後経時的に皮膚蒼白度の判定を行い比較検討した。その結果、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」は著明な皮膚血管収縮能を示し、標準製剤との比較においても有意差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。  (2) 抗炎症作用 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」と標準製剤(軟膏剤、0.05%) の効力比較試験(ラットクロトン油耳浮腫抑制試験、ラットカラゲニン足浮腫抑制試験、ラット血管透過性抑制試験、ラット肉芽増殖抑制試験)を実施した。その結果、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」は著明な抗炎症作用を示し、標準製剤との比較において	
	使用期限	3年(室温保存)	
	包装	5g×10、5g×50、500g	