

C₆H₈O₆

本剤はだ円形の錠剤のため、落下等の衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意ください。

IWAKI

第3類医薬品

130錠

ビタミンC錠

500「イワキ」

1錠中ビタミンC 500mgの高単位
割って飲める分割線入り
ナトリウムフリー



イメージ

年齢	1回量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
小児(7歳以上15歳未満)	1錠	2回
7歳未満の乳幼児	服用させないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を守ってください。2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。3. のみにくい場合は、割線がついていますので割ってお飲みください。

成分・分量

成分	4錠(18錠)中 アスコルビン酸(ビタミンC)2000mg 含有
添加物	カルメロース、トウモロコシデンプン、セルロース、ビタミンB ₂ 、ステアリン酸Mg
性状	だ円形、分割線のある白色の錠剤

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。これらの検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお話してください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)錠剤に水分が付着すると表面が変色しますので、ぬれた手で触れないでください。(5)容器の詰め物は、運送中の錠剤破損防止用です。開封後は捨ててください。(本剤はだ円形の錠剤のため、落下等の衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意ください。)(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても速やかに服用してください。使用期限は容器及び外箱に表示してあります。

お問い合わせ先

お問い合わせのお店又は下記にお願い致します。
岩城製薬株式会社 電話(03)3668-1573 受付時間 平日 9:00~17:00

製造販売



岩城製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2

開封年月日

年

月

日

・錠剤に水分が付着すると表面が変色します。ぬれた手で触れないでください。

ご使用に際して、この外箱を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンC錠500「イワキ」130錠



使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合は、服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3. 1ヶ月服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血

上記の症状について、1ヶ月ほど服用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。

- 次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

1日2回朝・夕の食後に口の中できず、そのまま水がお湯などでのおみください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



4 987020 010911

紙箱

使用期限
製造番号

岩城製薬株式会社